



COORTE DE 1982 - ESTUDO PERINATAL

1. ☐ Benef. Portug. (1) ☐ Hosp. Univ. (3) Nº ☐☐☐☐☐☐
☐ Santa Casa (2) ☐ Outro (4)

7-12. Dia do nascimento: ☐☐ ☐☐ ☐☐

13. Dia da semana:

☐ Dom (1) ☐ Qua (4) ☐ Sab (7)
☐ Seg (2) ☐ Qui (5)
☐ Ter (3) ☐ Sex (6)

14. Hora do nascimento:

☐ 0.01 – 6h (1) ☐ 12.01 – 18h (3)
☐ 6.01 – 12h (2) ☐ 18.01 – 24h (4)

Nome da mãe:

Nome do RN:

Endereço:

15. ☐ Pelotas urbana
☐ Pelotas rural
☐ Outra cidade

16. Categoria:

☐ Particular (1) ☐ FUNRURAL (4)
☐ INAMPS (2) ☐ Indigente (5)
☐ IPERGS (3) ☐ Outro convênio (6)

17-19. Idade: ☐☐ anos

☐ ≤ 19 (1) ☐ 30-34 (4)
☐ 20-24 (2) ☐ 35-39 (5)
☐ 25-29 (3) ☐ ≥ 40 (6)

20. Estado civil:

☐ vive c/ marido ou comp. (1)
☐ vive s/ marido ou comp. (2)

21-22. Anos de estudo completados com sucesso: ☐☐ anos

23. Renda familiar do casal – SM (salário mínimo):

☐ ≤ 1 SM (1) ☐ 3,1 – 6 SM (3) ☐ > 10 SM (5)
☐ 1,1 – 3 SM (2) ☐ 6,1 – 10 SM (4)

☐ ☐☐☐☐☐
1 2 3 4 5 6

☐☐ ☐☐ ☐☐
7 8 9 10 11 12

☐
13

☐
14

☐
15

☐
16

☐☐ ☐
17 18 19

☐
20

☐☐
21 22

☐
23

24. Raça: ☐ branca (1) ☐ negra (2) ☐ outra (3)

☐
24

25. Fumo:

☐ não (1) ☐ ≥ 15 cig/d parte grav (4)
☐ 1-14 cig/d parte grav (2) ☐ ≥ 15 cig/d toda grav (5)
☐ 1-14 cig/d toda grav (3)

☐
25

26-27. Consultou durante a gravidez (pré-natal):

☐ não (99) ☐ sim, ☐☐ consultas (01,02,03...)

☐☐
26 27

28-30. Peso pré-gestacional: ☐☐ , ☐ Kg

☐☐ ☐
28 29 30

31-34. Peso no dia do parto: ☐☐☐ , ☐ Kg

☐☐☐ ☐
31 32 33 34

35-36. Altura: 1, ☐☐ m

☐☐
35 36

37-41. ☐☐ gestações ☐☐ paridade ☐ abortos

☐☐ ☐☐ ☐
37 38 39 40 41

42-46. Partos anteriores: ☐☐ vaginais ☐ cesarianas

☐☐ ☐
42 43 44

☐ natimortos ☐ mortes neonatais

☐ ☐
45 46

47-50. Peso de nascimento dos filhos anteriores:

☐ 2.500 g ou menos (47) ☐ 3.001 g – 4.000 g (49)
☐ 2.501 g – 3.000 g (48) ☐ 4.001 g ou mais (50)

☐☐☐☐
47 48 49 50

51-53. Intervalo intergestacional (intervalo de tempo entre o último parto (ou aborto) e o início da presente gestação.

☐☐☐
51 52 53

☐☐☐ meses ☐ desconhecido (999)

Data do último parto ou aborto: | _ | _ | | _ | _ | | _ | _ |
dia mês ano

Com quantos meses iniciou o pré-natal: | _ |

54. Fatores de alto risco gestacional:

☐ não (1) ☐ aborto, natimorto ou pré-termo prévio (5)
☐ diabete (2) ☐ ameaça de aborto (6)
☐ toxemia (3) ☐ outra (7)
☐ hipert. arterial (4)

☐
54

55-56. Idade gestacional: ☐☐ semanas

☐☐
55 56

57. Parto: ☐ único (1) ☐ múltiplo (2) ☐ múltiplo (3)

☐
57

58. Parto feito por:

☐ médico (1)
☐ parteira (2)

☐ estudante (3)
☐ outro (4)

☐
58

59-62. Peso de nascimento: , g

59 60 61 62

63. ☐ 1.000 g ou menos (1)
☐ 1.001 – 1.500 g (2)
☐ 1.501 – 2.000 g (3)
☐ 2.001 – 2.250 g (4)
☐ 2.251 – 2.500 g (5)

☐ 2.501 – 3.000 g (6)
☐ 3.001 – 3.500 g (7)
☐ 3.501 – 4.000 g (8)
☐ 4.001 g ou mais (9)

☐
63

64. Sexo : ☐ masculino

☐ feminino

☐
64

65. Tipo de parto:

☐ vaginal (1)
☐ vag. c/ fórceps (2)
☐ vag. c/ vácuo (3)
☐ vag. induzido (4)

☐ vag. induz. c/ fórceps (5)
☐ vag. c/ analgesia (6)
☐ vag. c/ analg. c/ fórceps (7)
☐ cesariana (8)

☐
65

66-69. Razão para cesariana:

☐ sofrimento fetal (1)
☐ desproporção F-P (2)
☐ distócia apresentação (3)
☐ hemorragia materna (4)
☐ parada de progressão (5)
☐ eclâmpsia, pré-eclâmpsia (6)
☐ pós-maturidade (7)

☐ morte fetal (8)
☐ diabetes materna (9)
☐ repetição (10)
☐ para ligar trompas (11)
☐ eletiva (12)
☐ outra (13)
☐ desconhecida (14)
☐ não se aplica (99)

66 67 68 69

70. Razão para indução:

☐ pós-maturidade (1)
☐ pré-eclâmpsia (2)
☐ bolsa rota (3)
☐ ISO-imunização RH (4)

☐ morte fetal (5)
☐ eletiva (6)
☐ outra (7)
☐ desconhecida (8)
☐ não se aplica (99)

☐
70

71-74. Morbidade nos primeiros 7 dias:

☐ pré-termo (1)
☐ pós-termo (2)
☐ taquipnéia transit. (3)
☐ membrana hialina (4)
☐ malformação (5)
☐ sínd. cromossômica (6)
☐ icterícia importante (7)
☐ tocotrauma (frat., etc) (8)
☐ hemorragia cerebral (9)

☐ edema cerebral (10)
☐ meningite (11)
☐ sepsis (12)
☐ diarreia (13)
☐ pneumonia (14)
☐ hipoglicemia (15)
☐ hipocalcemia (16)
☐ outra (17)
☐ não se aplica (99)

71 72 73 74

75. Recém-nascido:	<input type="checkbox"/> vivo (1)	<input type="checkbox"/> natimorto (2)	<input type="checkbox"/>
			75
76. Se natimorto:	<input type="checkbox"/> antepartum (1)	<input type="checkbox"/> intrapartum (2)	<input type="checkbox"/>
			76
77. Mortalidade nos primeiros 7 dias de vida:			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> não (1)	<input type="checkbox"/> sim (1º dia) (2)	<input type="checkbox"/> sim (2º- 6º dia) (3)	77
78. Causa do óbito:			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> malformação (1)	<input type="checkbox"/> memb. hialina (5)		78
<input type="checkbox"/> rel. prematuridade (2)	<input type="checkbox"/> anóxia (6)		
<input type="checkbox"/> infecção (3)	<input type="checkbox"/> outra (7)		
<input type="checkbox"/> trauma parto (4)	<input type="checkbox"/> não se aplica (99)		
79. Mortalidade 7-28 dias:	<input type="checkbox"/> sim (1)	<input type="checkbox"/> não (2)	<input type="checkbox"/>
			79
80. Mortalidade 1-12 meses:	<input type="checkbox"/> sim (1)	<input type="checkbox"/> não (2)	<input type="checkbox"/>
			80